

## **ИНСТРУКЦИЯ по применению лекарственного препарата для медицинского применения АРТРАКАМ®**

*Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.*

- *Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.*
- *Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.*
- *Это лекарство назначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.*

**Регистрационный номер:** ЛСР-008621/09

**Торговое наименование лекарственного препарата** АРТРАКАМ®

**Международное непатентованное или химическое наименование** Глюкозамин

**Лекарственная форма:** порошок для приготовления раствора для приема внутрь

### **Состав:**

Один пакетик содержит:

*активное вещество:* глюкозамина сульфат натрия хлорид в пересчете на 100% вещество 1,884 г., в том числе глюкозамина сульфата - 1,5г.

*вспомогательные вещества:*

сорбитол - 0,296 г.

лимонная кислота - 0,02 г.

**Описание:** Белый или белый со слегка желтоватым оттенком порошок.

**Фармакотерапевтическая группа:** репарации тканей стимулятор.

**Код АТХ:** M01AX05

### **Фармакологические свойства:**

Глюкозамина сульфат обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, восполняет эндогенный дефицит глюкозамина, стимулирует синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты синовиальной жидкости; увеличивает проницаемость суставной капсулы, восстанавливает ферментативные процессы в клетках синовиальной мембраны и суставного хряща. Способствует фиксации серы в процессе синтеза хондроитинсерной кислоты, тормозит развитие дегенеративных процессов в суставах, восстанавливает их функцию, уменьшая суставные боли.

### **Фармакокинетика:**

Всасывание в желудочно-кишечном тракте 90 %, биодоступность 26 %, период полувыведения 70 часов.

### **Показания к применению:**

Остеоартроз периферических суставов, и суставов позвоночника, остеохондроз.

### **Противопоказания:**

Индивидуальная повышенная чувствительность к глюкозамину сульфату и другим компонентам препарата. Тяжелая ХПН, беременность, период лактации.

Не рекомендуется назначение препарата в детском возрасте ( до 12 лет) из-за отсутствия клинических данных у этой категории пациентов.

**С осторожностью:**

При непереносимости морепродуктов (креветки, моллюски) вероятность развития аллергических реакций на препарат возрастает.  
Бронхиальная астма, сахарный диабет.

**Способ применения и дозы:**

Внутрь. Содержимое одного пакетика растворяют в 200 мл воды, принимают внутрь 1 раз в сутки в течение 6 недель.

По назначению врача курс лечения можно повторять с интервалом 2 месяца.

**Побочное действие:**

Переносимость препарата хорошая, в отдельных случаях возможны: гастралгия, метеоризм, диарея, запор, аллергические реакции - крапивница, зуд.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.**

Данные о влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами отсутствуют.

**Передозировка:**

Случаи передозировки неизвестны. *Лечение:* промывание желудка, симптоматическая терапия.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:**

Совместим с нестероидными противовоспалительными средствами, парацетамолом и глюкокортикостероидами. Увеличивает абсорбцию тетрациклинов, уменьшает - полусинтетических пенициллинов, хлорамфеникола.

**Форма выпуска:**

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1,5 г

По 2,2 г в пакеты термосвариваемые из комбинированного материала «Цефлен» марки НС50СА7RТ30 по документации фирмы-изготовителя «Soral», Франция или «Буфлен» по ТУ 5453-046-45982064-2003.

20 пакетов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона по ГОСТ 7933-89 или ГОСТ 123-01-81 или ГОСТ 123-03-80, ОСТ 64-071-89.

Групповая упаковка и транспортная тара в соответствии с ГОСТ 17768-90.

**Хранение**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности: 3 года**

Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Отпускается без рецепта.

**Производитель**

ООО НПО «ФармВИЛАР»

249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, 115.

**Организация, принимающая претензии от потребителей:**

ООО «Инкамфарм»

Юридический адрес:

115088, Россия, г. Москва, ул. Новоостاپовская, д. 6, пом. 4

Тел./факс: (495) 287-45-02

www.artradol.com